

Профилактика острых отравлений в быту в Ачитском ГО

Отравление – это болезненное состояние организма, вызванное попаданием в организм человека ядовитого вещества. В быту отравление чаще всего наступает при употреблении недоброкачественных продуктов питания, медицинских препаратов, использовании средств бытовой химии и удобрений, неосторожном обращении с приборами, содержащими ртуть. Возможно также отравление тяжелыми металлами (свинцом, кадмием), нитратами, пестицидами, этиловым и метиловым спиртом, никотином, наркотиками, угарным газом, бытовым газом. Отравление угарным газом происходит при пожарах, в гаражах и ангарах, где работают двигатели внутреннего сгорания, а ворота и двери закрыты, в случае нарушения правил пользования отопительными системами.

В 2019 году на территории Ачитского района зарегистрировано 11 случаев отравлений населения в быту, что на уровне прошлого года (в 2018 г. – 11 случаев). Интенсивный показатель острых отравлений в быту составил 69,66 на 100 тыс. жителей, что на 1,5 % выше уровня 2018 года (68,62 на 100 тыс. населения).

По гендерному признаку отравления среди женщин составили 6 случаев (54,6%), среди мужчин 5 случаев (45,4%).

По возрастным группам острые отравления в быту распределились следующим образом:

- подростки 15-17 лет – 1 случай (9%),
- дети 7-14 лет – 2 случая (18,2%),
- лица в возрасте 18-35 лет – 2 случая (18,2%),
- лица в возрасте 36-54 лет – 3 случая (27,3%),
- лица в возрасте 55 лет и старше – 3 случая (27,3%).

По контингентам острые отравления в быту за 2019 год распределились следующим образом:

- неработающие – 5 случаев (45,4 %),
- пенсионеры, инвалиды – 3 случая (27,3 %),
- учащиеся – 3 случая (27,3 %),

По группам острые отравления населения по их преобладанию в общей структуре и уровню интенсивного показателя распределились следующим образом:

1. Отравления лекарственными препаратами – 4 человека, интенсивный показатель составил 25,33 на 100 тыс. населения, что в 2 раза выше показателя прошлого года (12,48 на 100тыс.населения);
2. Отравление алкоголем – 4 случая, интенсивный показатель составил 25,33 на 100 тыс. населения, что в 2 раза выше показателя прошлого года (12,48 на 100 тыс. населения);
3. Отравление уксусной кислотой – 1 случай, интенсивный показатель составил 6,33 на 100 тыс. населения;
4. Отравление бытовой химией и газами – 1 случай, интенсивный показатель составил 6,33 на 100 тыс. населения, что на 83 % ниже показателя прошлого года (37,43 на 100тыс.населения);
5. Отравление неуточненными веществами – 1 случай, интенсивный показатель составил 6,33 на 100 тыс. населения, что превышает уровень прошлого года на 1,4%.

Зарегистрировано 5 случаев отравления с целью суицида, с летальным исходом – 1. Всего в 2019 году от отравлений в быту умер 1 человек. Показатель смертности за 2019 год составил 6,4 на 100 тыс. населения, что ниже уровня прошлого года на 79,2%. Ведущее место в структуре смертности занимают отравления алкоголем – 1 человек.

Анализ причин суицидальных попыток и смертельных исходов свидетельствует о том, что средствами суицидов в основном являются отравление алкоголем. К основной группе риска с летальным исходом так же относятся лица 55 лет и старше при приобретении алкогольной продукции в несанкционированных местах продажи.

Профилактика отравлений в быту:

- не принимайте лекарственные препараты с истекшим сроком годности, вместе с алкоголем и дозами, превышающими предписанные врачом;
- этиловый и метиловый спирт, а также изделия на их основе используйте только для медицинских и технических целей;
- средства бытовой химии применяйте только по назначению в строгом соответствии с инструкциями;
- хранить препараты бытовой химии в недоступных для детей местах;
- медицинские препараты, средства бытовой химии и другие опасные вещества храните отдельно от пищевых продуктов, в местах, недоступных для детей;
- не оставлять маленьких детей без присмотра, а более старшим детям объяснить об опасности самостоятельного употребления лекарственных и химических средств.
- не храните пищевые продукты в таре, освободившейся из-под химических веществ;

В случае обнаружения симптомов отравления необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

