

Профилактика острых отравлений в быту в Ачитском ГО

Отравление – это болезненное состояние организма, вызванное попаданием в организм человека ядовитого вещества. В быту отравление чаще всего наступает при употреблении недоброкачественных продуктов питания, медицинских препаратов, использовании средств бытовой химии и удобрений, неосторожном обращении с приборами, содержащими ртуть. Возможно также отравление тяжелыми металлами (свинцом, кадмием), нитратами, пестицидами, этиловым и метиловым спиртом, никотином, наркотиками, угарным газом, бытовым газом. Отравление угарным газом происходит при пожарах, в гаражах и ангарах, где работают двигатели внутреннего сгорания, а ворота и двери закрыты, в случае нарушения правил пользования отопительными системами.

В первом полугодии 2020 года на территории Ачитского района зарегистрировано 4 случая отравлений населения в быту, что на уровне аналогичного периода прошлого года (в 2019 г. – 4 случая). Интенсивный показатель острых отравлений в быту составил 25,68 на 100 тыс. жителей, что на уровне 2019 года (25,33 на 100 тыс. населения).

Отравления среди женщин в первом полугодии не регистрировались, среди мужчин – 4 случая (100 %).

По возрастным группам острые отравления в быту распределились следующим образом:

- подростки 15-17 лет – 1 случай (25 %),
- лица в возрасте 18-35 лет – 1 случай (25 %),
- лица в возрасте 55 лет и старше – 2 случая (50 %).

По контингентам острые отравления в быту распределились следующим образом:

- неработающие – 2 случая (50 %),
- пенсионеры, инвалиды – 2 случая (50 %),

По группам острые отравления населения по их преобладанию в общей структуре и уровню интенсивного показателя распределились следующим образом:

1. Отравления алкоголем – 1 человек, интенсивный показатель составил 6,42 на 100 тыс. населения, что в 2 раза ниже показателя прошлого года (12,66 на 100 тыс. населения);
2. Отравление лекарственными препаратами – 1 человек, интенсивный показатель составил 6,42 на 100 тыс. населения, что в 2 раза ниже показателя прошлого года (12,66 на 100 тыс. населения);
3. Отравление уксусной кислотой – 1 случай, интенсивный показатель составил 6,42 на 100 тыс. населения. В первом полугодии 2020 г. отравления уксусной кислотой не регистрировались.;
4. Отравление угарным газом – 1 случай, интенсивный показатель составил 6,42 на 100 тыс. населения. В первом полугодии 2019 г. отравления угарным газом не регистрировались.;

Зарегистрировано 2 случая отравления с целью суицида. Летальных исходов острых отравлений в быту в первом полугодии 2020 г. не зарегистрировано.

Анализ причин суицидальных попыток свидетельствует о том, что средствами суицидов в основном являются отравление лекарственными средствами и уксусной кислотой. К основной группе риска с летальным исходом так же относятся лица 55 лет и старше.

Профилактика отравлений в быту:

- не принимайте лекарственные препараты с истекшим сроком годности, вместе с алкоголем и дозами, превышающими предписанные врачом;
- этиловый и метиловый спирт, а также изделия на их основе используйте только для медицинских и технических целей;
- средства бытовой химии применяйте только по назначению в строгом соответствии с инструкциями;
- хранить препараты бытовой химии в недоступных для детей местах;
- медицинские препараты, средства бытовой химии и другие опасные вещества храните отдельно от пищевых продуктов, в местах, недоступных для детей;
- не оставлять маленьких детей без присмотра, а более старшим детям объяснить об опасности самостоятельного употребления лекарственных и химических средств.
- не храните пищевые продукты в таре, освободившейся из-под химических веществ;

В случае обнаружения симптомов отравления необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

